

## ПЕРЕЧЕНЬ


Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в стационарных условиях на 2024-2025гг.

Утверждаю:

И. о. главного врача КГБУЗ "Норильская  
межрайонная детская больница"

С.С. Репухов

Дата: 29.12.2023г.



21	Цинковая соль	паста пер-лоран 1112 20г	ФК	Противопоказание: Гиперчувствительность, ЯБЖ и 12-перстной кишки, хронический гастрит, Берсерленность, период лактации. С осторожностью: Почечная недостаточность.
21	Уголь активированный	порошок 250г	ФК	Противопоказание: Гиперчувствительность, ЯБЖ и 12-перстной кишки, язвенный колит, кровотечения из ЖКТ.
22	<b>СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ</b>		ГТ	
22	Дефералокс	таблетки диспергируемые 125мг №28	ГТ	Противопоказание: КК < 60 мг/дл или концентрации креатинина в сыворотке крови в 2 и более раз выше верхней границы возрастной нормы, пашетта с гемодиализом и гемодиализом, дисметаболическими заболеваниями почек, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Ограничение: У детей младше 2 лет отсутствует. С осторожностью: беременность, кормление грудью, возрастная норма или с КК более 60 мг/дл, пашетта с нарушениями функции печени, одновременном с антацидами и ЛП, обладающими слабительным действием или при снижении количества тромбоцитов < 50x10 <sup>9</sup> /л. При применении препарата у взрослых пашетта и детей возможно развитие таких серьезных осложнений со стороны пищеварительной системы, как желудочно-кишечные кровотечения, язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки. Если жидкий стул продолжает у пашетта с переносимостью галактозы, ташетта дефицитом лактазы или галакто- галактозной мальабсорбцией.
22	Диметилпиперазинсульфонат натрия	р-р в ам и пак 8%, амл 5мл	ГТ	Противопоказание: Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, артериальная гипертензия.
22	Натрия тиосульфат	р-р в ам 30%, амл 10мл	ГТ	Противопоказание: гиперчувствительность.
22	Флуканазол	р-р в ам 0,5мг 5мл	ФК	Гиперчувствительность, отравление циклотимом антидепрессантами. Противопоказан больным, которые получают бепридазин или леветимин, потенциально угнетающих функцию печени, интубированной гипертензии или эпилептического статуса). С осторожностью: одновременное применение антидепрессантами.
22	Цитохром С	р-р в ам и амл 0,25%, амл 4мл	ФК	Противопоказание: Гиперчувствительность, Берсерленность, период лактации.

Председатель комиссии:  
Зам. главного врача по медицинской части  
Зам. председателя комиссии


  
Н.Н. Елькина

  
Е.С. Бараненко


Врач клинический фармаколог  
Члены комиссии:

  
М.С. Киселева

  
Е.А. Широкова

  
Т.М. Властовская

  
С.Ю. Бендюков

  
Р.М. Гатина

  
Н.П. Макарова

  
Е.В. Ротнина

Заведующий ОЛО

Заведующий поликлиникой

Заведующий консультативно-диагностическим центром

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии

Заведующий педиатрическим отделением

Главная медицинская сестра

Зав. отделением клинической лабораторной диагностики